


QUESTION 1 / VRAAG 1

- 1.1 C ✓✓ (2)
1.2 B ✓✓ (2)
1.3 D ✓✓ (2)
1.4 D ✓✓ (2)
1.5 A ✓✓ (2)
1.6 B ✓✓ (2)
1.7 B ✓✓ (2)
1.8 A ✓✓ (2)
1.9 D ✓✓ (2)
1.10 C ✓✓ (2)
- [20]**


QUESTION 2 / VRAAG 2

- 2.1
2.1.1 B ✓ (1)
2.1.2 E ✓ (1)
2.1.3 F ✓ (1)
2.2
2.2.1 2-bromo-3-chloro-4-methylpentane
2-bromo-3-chloro-4-metielpentaan / 2-broom-3-chloor-4-metielpentaan
Marking criteria / Nasienriqlyne:
• Correct stem i.e. pentane. / Korrekte stam d.i. pentaan. ✓
• All substituents correctly identified. / Alle substituente korrek geïdentifiseer. ✓
• Substituents correctly numbered, in alphabetical order, hyphens and commas correctly used. ✓
Substituente korrek genommer, in alfabetiese volgorde, koppeltekens en kommas korrek gebruik.
(3)
- 2.2.2 Ethene / Eteen ✓ (1)



2.3

2.3.1



Marking criteria / Nasienriglyne:


- Six saturated C atoms in longest chain i.e. hexane. ✓
Ses versadige C-atome in langste ketting d.i. heksaan.
- Three methyl substituents on second C and fourth C. ✓
Drie metielsubstituente op tweede C en vierde C.

Notes / Aantekeninge:

- If correct structure and number of bonds, but H atoms omitted / Indien korrekte struktuur en getal bindings, maar H-atome weggelaat: Max / Maks. $\frac{1}{2}$
- Condensed or semi-structural formula:
Gekondenseerde of semistruktuurformule: Max./Maks. $\frac{1}{2}$
- Molecular formula / Molekuläre formule: $\frac{0}{2}$

(2)

2.3.2



Marking criteria / Nasienriglyne:

- Whole structure correct / Hele struktuur korrek: $\frac{2}{2}$
- Only functional group correct / Slegs funksionele groep korrek: $\frac{1}{2}$

Notes / Aantekeninge:

- If two or more functional groups/Indien twee of meer funksionele groepe: $\frac{0}{2}$
- Condensed or semi-structural formula:
Gekondenseerde of semistruktuurformule: Max / Maks $\frac{1}{2}$
- Molecular formula / Molekuläre formule: $\frac{0}{2}$

(2)

2.4

2.4.1 (Compounds with) the same molecular formula ✓ but different functional groups / different homologous series. ✓


(Verbindings met) dieselfde molekuläre formule, maar verskillende funksionele groepe / verskillende homoloë reekse.

(2)

2.4.2 B & F ✓

(1)

[14]



QUESTION 3 / VRAAG 3

3.1 ANY ONE / ENIGE EEN:

- Alkanes have ONLY single bonds. ✓
Alkane het SLEGS enkelbindings.
- Alkanes have single bonds between C atoms.
Alkane het enkelbindings tussen C-atome.
- Alkanes have no double OR triple bonds OR multiple bonds.
- *Alkane het geen dubbel- OF trippelbindings OF meervoudige bindings nie.*
- Alkanes contain the maximum number of H atoms bonded to C atoms.
Alkane bevat die maksimum getal H-atome gebind aan C-atome.

(1)


3.2

3.2.1 ANY ONE / ENIGE EEN:

$\begin{array}{c} \\ -C-O-H \checkmark \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ -C-OH \\ \end{array}$	- OH	- O - H
R - OH	R - O - H		

(1)

3.2.2




Marking criteria / Nasienriglyne:

- - OH group on second C atom of longest chain. ✓
- OH-groep op tweede C-atoom van langste ketting.
- Tertiary group consisting of four C atoms with methyl group on 2nd C atom. ✓
Tersiëre groep bestaande uit vier C-atome met metielgroep op 2de C-atoom.
- If two or more functional groups / Indien twee of meer funksionele groepe: 0/2

Notes / Aantekeninge:

- Accept / Aanvaar – OH
- If correct structure and number of bonds, but H atoms omitted / Indien korrekte struktuur en getal bindings, maar H-atome weggelaat: Max / Maks. 1/2
- Condensed or semi-structural formula / Gekondenseerde of semistruktuurformule: Max / Maks. 1/2
- Molecular formula / Molekulêre formule: 0/2

(2)



3.3

3.3.1

Criteria for investigative question / Riglyne vir ondersoekende vraag:	
The <u>dependent</u> and <u>independent</u> variables are stated. <i>Die afhanklike en onafhanklike veranderlikes is genoem.</i>	✓
Ask a question about the relationship between the <u>independent</u> and <u>dependent</u> variables. <i>Vra 'n vraag oor die verwantskap tussen die onafhanklike en afhanklike veranderlikes.</i>	✓

Examples / Voorbeelde:

- How does an increase in chain length / molecular size / molecular structure / molecular mass / surface area influence boiling point?
Hoe beïnvloed 'n toename in kettinglengte / molekulêre grootte / molekulêre struktuur / molekulêre massa / reaksieoppervlak die kookpunt?
- What is the relationship between chain length / molecular size / molecular structure / molecular mass / surface area and boiling point?
Wat is die verwantskap tussen kettinglengte / molekulêre grootte / molekulêre struktuur / molekulêre massa / oppervlakte en kookpunt?

(2)

3.3.2

- Structure / Struktuur:**

The chain length / molecular size / molecular structure / molecular mass / surface area increases. ✓
Die kettinglengte / molekulêre grootte / molekulêre struktuur / molekulêre massa / oppervlakte neem toe.

- Intermolecular forces / Intermolekulêre kragte:**

Increase in strength of intermolecular forces / induced dipole / London / dispersion / Van der Waals forces. ✓
Toename in sterkte van intermolekulêre kragte / geïnduseerde dipoolkragte / London-kragte / dispersiekragte / Van der Waalskragte.

- Energy / Energie:**

More energy needed to overcome / break intermolecular forces. ✓
Meer energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom / breek.

OR / OF

- Structure / Struktuur:**

From propane to methane the chain length / molecular size / molecular structure / molecular mass / surface area decreases. ✓
Van propaan na metaan neem die kettinglengte / molekulêre grootte / molekulêre struktuur / molekulêre massa / oppervlakte af.

- Intermolecular forces / Intermolekulêre kragte:**

Decrease in strength of intermolecular forces / induced dipole forces / London forces / dispersion forces. ✓
Afname in sterkte van intermolekulêre kragte / geïnduseerde dipoolkragte / London-kragte / dispersiekragte.

- Energy / Energie:**

Less energy needed to overcome / break intermolecular forces. ✓
Minder energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom / breek.

(3)

- 3.4
- Between propane molecules are London forces / dispersion forces / induced dipole forces. ✓
Tussen propaanmolekule is Londonkragte / dispersiekragte / geïnduseerde dipoolkragte.
 - Between propan-1-ol molecules are London forces / dispersion forces / induced dipole forces and hydrogen bonds. ✓
Tussen propan-1-ol molekule is Londonkragte / dispersiekragte / geïnduseerde dipoolkragte en waterstofbindings.
 - Hydrogen bonds / Forces between alcohol molecules are stronger or need more energy than London forces / dispersion forces / induced dipole forces. ✓
Waterstofbindings / Kragte tussen alkoholmolekule is sterker of benodig meer energie om oorkom te word as Londonkragte / dispersiekragte / geïnduseerde dipoolkragte.

OR/OF

Between propane molecules are weak London forces / dispersion forces / induced dipole forces ✓ and between propan-1-ol molecules are strong hydrogen bonds. ✓✓

Tussen propaanmolekule is swak Londonkragte / dispersiekragte / geïnduseerde dipoolkragte en tussen propan-1-ol molekule is sterk waterstofbindings.

(3)
[12]

QUESTION 4 / VRAAG 4

4.1

4.1.1 Substitution / chlorination / halogenation ✓

Substitusie / chlorering / halogenering / halogenasie

(1)

4.1.2 Substitution / hydrolysis ✓

Substitusie / hidrolise

021-711-118

PRIVATE BAG X 110
PRETORIA 0001


PUBLIC EXAMINATIONS

(1)

4.2

4.2.1 Hydrogenation / Hidrogenasie / Hidrogenering ✓

4.2.2



Notes / Aantekeninge:

- Ignore/Ignoreer ⇐
- Accept H_2 if condensed. / Aanvaar H_2 as gekondenseerd.
- Any additional reactants and/or products

Enige addisionele reaktanse en / of produkte:

Max./Maks. $\frac{2}{3}$

- Accept coefficients that are multiples.
Aanvaar koëffisiënte wat veelvoude is.
- Molecular / condensed formulae


Molekulêre-/ gekondenseerde formule:

Max./Maks. $\frac{2}{3}$

(3)



4.3



Marking criteria / Nasienriglyne:

- Whole structure correct / Hele struktuur korrek: $\frac{2}{2}$
- Only ONE Cl atom as functional group. / Slegs EEN Cl-atoom as funksionele groep. $\frac{1}{2}$

Notes / Aantekeninge:

- Condensed or semi-structural formula
Gekondenseerde of semistruktuurformule: Max./Maks. $\frac{1}{2}$
- Molecular formula. / Molekuläre formule: $\frac{0}{2}$
- If functional group is incorrect. / Indien funksionele groep verkeerd is: $\frac{0}{2}$

(2)

4.4

4.4.1 Esterification / Condensation ✓

Veresterung / Esterifikasie / Kondensasie

(1)


4.4.2

(Concentrated) H_2SO_4 / (Concentrated) sulphuric acid ✓

(Gekonsentreerde) H_2SO_4 / (Gekonsentreerde) swawelsuur of swaelsuur

(1)

4.4.3



Marking criteria / Nasienriglyne:

- Whole structure correct / Hele struktuur korrek: $\frac{2}{2}$
- Only functional group correct / Slegs funksionele groep korrek: $\frac{1}{2}$

Notes / Aantekeninge:

- If two or more functional groups/Indien twee of meer funksionele groepe: $\frac{0}{2}$
- Condensed or semi-structural formula:
Gekondenseerde of semistruktuurformule: Max./Maks. $\frac{1}{2}$
- Molecular formula / Molekuläre formule: $\frac{0}{2}$
- If functional group is incorrect/Indien funksionele groep verkeerd is: $\frac{0}{2}$

(2)

4.4.4

Propyl ✓ ethanoate ✓

Propyletanoaat

(2)


4.5

Sulphuric acid / H_2SO_4 / Phosphoric acid / H_3PO_4 / (conc.) NaOH / (conc.) sodium hydroxide ✓

Swawelsuur / Swaelsuur / H_2SO_4 / Fosforsuur / H_3PO_4 / (gekon.) NaOH / (gekon.) natriumhidroksied

(1)

[15]



QUESTION 5 / VRAAG 5

5.1 ONLY ANY ONE OF/ SLEGS ENIGE EEN VAN:

- Change in concentration of products / reactants ✓ per (unit) time. ✓
Verandering in konsentrasie van produkte / reaktanse per (eenheids)tyd.
- Rate of change in concentration. ✓✓
Tempo van verandering in konsentrasie.
- Change in amount / number of moles / volume / mass of products or reactants per (unit) time.
Verandering in hoeveelheid / getal mol/volume / massa van produkte of reaktanse per (eenheids)tyd.
- Amount / number of moles / volume / mass of products formed or reactants used per (unit) time.
Hoeveelheid / getal mol / volume / massa van produkte gevorm of reaktanse gebruik per (eenheids)tyd.

(2)

5.2

5.2.1 Temperature / Temperatuur ✓

(1)

5.2.2 Rate of reaction / Volume of gas (formed) per (unit) time ✓

Reaksietempo / Volume gas (gevorm) per (eenheids)tyd

(1)

5.3

- Larger mass / amount / surface area. ✓
Groter massa / hoeveelheid / reaksieoppervlak.
- More effective collisions per (unit) time. / Frequency of effective collisions increase./ More particles collide with sufficient kinetic energy & correct orientation per (unit) time. ✓✓
Meer effektiewe botsings per (eenheids)tyd. / Frekwensie van effektiewe botsings verhoog./ Meer deeltjies bots met genoeg kinetiese energie & korrekte oriëntasie per tyd(seenheid).

IF / INDIEN:

- Larger mass / amount / surface area. ✓
Groter massa / hoeveelheid / reaksieoppervlak.
- More particles collide. / More collisions. ✓
Meer deeltjies bots. / Meer botsings.

Max./Maks. 2/3


Notes / Aantekeninge:

If no reference to mass / amount / surface area in answer:

Indien geen verwysing na massa / hoeveelheid / reaksieoppervlak in antwoord:

0/3

(3)





5.4

Marking criteria / Nasienriglyne:

Compare Exp. 1 with Exp. 2: <i>Vergelyk Eksp. 1 met Eksp. 2:</i>	The reaction in <u>exp. 1</u> is faster in <u>exp. 1</u> than in <u>exp. 2</u> due to the higher acid concentration. <i>Die reaksie in eksp. 1 is vinniger as dié in eksp. 2 as gevolg van die hoér suurkonsentrasie.</i>	✓
<i>Eks. 1 met Eks. 3 & 4:</i>	Therefore the <u>gradient</u> of the graph representing <u>exp. 1</u> is <u>greater / steeper</u> than that of <u>exp. 2</u> . / Graph of Exp. 1 reaches constant volume in shorter time than exp. 2. <i>Dus is die gradiënt van die grafiek wat eksp. 1 voorstel, groter/steiler as dié vir eksp. 2. / Grafiek van exp. 1 bereik konstante volume in korter tyd as dié vir eksp. 2.</i>	✓
Compare Exp. 1 with Exp 3 & 4: <i>Vergelyk Eksp. 1 met Eks. 3 & 4:</i>	The reaction in <u>exp. 3</u> is faster than that in <u>exp. 1</u> due to the <u>higher temperature</u> . <i>Die reaksie in eks. 3 is vinniger as dié in eksp. 1 as gevolg van die hoér temperatuur.</i>	✓
	The reaction in <u>exp. 4</u> is faster than that in <u>exp. 1</u> due to the <u>higher temperature / larger surface area</u> . <i>Die reaksie in eks. 4 is vinniger as dié in eksp. 1 as gevolg van die hoér temperatuur / groter reaksieoppervlak.</i>	✓
	OR/OF <i>Graph A represents exp. 4 due to the greater mass of CaCO₃ = greater yield of CO₂ at a faster rate.</i> <i>Grafiek A stel eksp. 4 voor as gevolg van die groter massa CaCO₃ - groter opbrengs CO₂ teen vinniger tempo.</i>	✓
	Therefore the gradient of the graphs of <u>exp. 3 & 4</u> are greater/steeper than that of <u>exp. 1</u> . / Graphs of Exp. 3 & 4 reaches constant volume in shorter time than exp. 1. <i>Dus is die gradiënte van die grafieke vir eksp. 3 & 4 is groter/steiler as dié in eksp. 1. / Grafieke van exp. 3 & 4 bereik konstante volume in korter tyd as dié vir eksp. 1.</i>	✓
Final answer <i>Finale antwoord</i>	C	✓

(6)

Notes/Aantekeninge

- Compare exp. 1 with exp. 2 / Vergelyk eksp. 1 met eksp. 2:
 - Factor & rate / Faktor & tempo.
 - Gradient / volume CO₂ per time / gradient / volume CO₂ per tyd.
- Compare exp. 1 with exp. 3 / Vergelyk eksp. 1 met eksp. 3:
 - Factor & rate / Faktor & tempo.
- Compare exp. 1 with exp. 4/ Vergelyk eksp. 1 met eksp. 4:
 - Factor & rate / Faktor & tempo.
- Compare gradient / volume CO₂ per time of exp 1 with that of exp. 3 & 4
Vergelyk gradiënt/volume CO₂ per tyd van eksp 1 met die van eksp. 3 & 4
- Final answer / finale antwoord: C

5.5

Marking criteria / Nasienriglyne:

- Divide volume by / Deel volume deur: 25,7 ✓
- Use ratio / Gebruik verhouding: $n(\text{CO}_2) = n(\text{CaCO}_3) = 1:1$ ✓
- Substitute / Vervang 100. ✓
- Subtraction / Aftrekking. ✓
- Final answer / Finale antwoord: 7,00 g to/tot 7,5 g ✓

PUBLIC EXAMINATIONS

OPTION 1 / OPSIE 1

$$n(\text{CO}_2) = \frac{V}{V_m}$$

$$= \frac{4,5}{25,7} \checkmark$$

$$= 0,18 \text{ mol (0,175 mol)}$$

$$n(\text{CaCO}_3) = n(\text{CO}_2) = 0,18 \text{ mol} \checkmark$$

$$n(\text{CaCO}_3) = \frac{m}{M}$$

$$0,18 = \frac{m}{100} \checkmark$$

$$\therefore m = 18 \text{ g (17,5 g)}$$

$$m(\text{CaCO}_3) \text{ not reacted/nie gereageer nie}: \\ 25 - 18 \checkmark = 7,00 \text{ g} \checkmark \quad (7,49 \text{ g})$$

(Accept range: 7,00 g – 7,5 g)
(Aanvaar gebied: 7,00 g – 7,5 g)

OPTION 2 / OPSIE 2

Calculate mass of CO_2 :
Bereken massa CO_2 :

$$n(\text{CO}_2) = \frac{V}{V_m}$$

$$= \frac{4,5}{25,7} \checkmark$$

$$= 0,18 \text{ mol (0,175 mol)}$$

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m}{M}$$

$$0,18 = \frac{m}{44}$$

$$\therefore m(\text{CO}_2) = 7,92 \text{ g (7,7043 g)} \quad \text{Ratio/verhouding}$$

$$m(\text{CaCO}_3 \text{ needed/benodig}) = \frac{7,92}{44} \times 100 \checkmark$$

$$= 18 \text{ g (17,5 g)}$$

$$m(\text{CaCO}_3 \text{ not reacted/nie gereageer nie}): \\ 25 - 18,00 \checkmark = 7,00 \text{ g} \checkmark \quad (7,49 \text{ g})$$

(Accept range: 7,00 g – 7,5 g)
(Aanvaar gebied: 7,00 g – 7,5 g)

(5)

OPTION 3 / OPSIE 3

$$25,7 \text{ dm}^3 : 1 \text{ mol}$$

$$4,5 \text{ dm}^3 : 0,18 \text{ mol} \checkmark$$

$$100 \text{ g} \checkmark : 1 \text{ mol}$$

$$x : 0,18 \text{ mol} \checkmark$$

$$x = 18 \text{ g}$$

$$m(\text{CaCO}_3 \text{ not reacted/nie gereageer nie}): \\ 25 - 18 \checkmark = 7,00 \text{ g} \checkmark$$

(Accept range: 7,00 g – 7,5 g)
(Aanvaar gebied: 7,00 g – 7,5 g)

OPTION 4 / OPSIE 4

$$100 \text{ g CaCO}_3 \rightarrow 25,7 \text{ dm}^3 \text{ CO}_2 \checkmark \checkmark$$

$$x \text{ g} \rightarrow 4,5 \text{ dm}^3 \text{ CO}_2 \checkmark$$

$$\therefore x = 17,51 \text{ g}$$

$$\text{Mass not reacted/Massa nie gereageer nie} \\ = 25 - 17,51 \checkmark \\ = 7,49 \text{ g} \checkmark$$

(Accept range: 7,00 g – 7,5 g)
(Aanvaar gebied: 7,00 g – 7,5 g)

(5)

QUESTION 6 / VRAAG 6

- 6.1 The stage in a chemical reaction when the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. ✓✓

Die stadium in 'n chemiese reaksie wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. ✓✓

OR / OF

- The stage in a chemical reaction when the concentrations of reactants and products remain constant. ✓✓

Die stadium in 'n chemiese reaksie wanneer die konsentrasies van reaktanse en produkte konstant bly. ✓✓

(2)


6.2

CALCULATIONS USING NUMBER OF MOLES

BEREKENINGE WAT GETAL MOL GEBRUIK

Mark allocation / Puntetoekening:

- Correct K_c expression (formulae in square brackets). ✓
Korrekte K_c uitdrukking (formules in vierkanthakies).
- Substitution of concentrations into K_c expression. ✓
Vervanging van konsentrasies in K_c -uitdrukking.
- Substitution of K_c value / *Vervanging van K_c -waarde*
- Equilibrium concentration of both NO_2 & N_2O_4 multiplied by $0,08 \text{ dm}^3$. ✓
Ewewigskonsentrasie van beide NO_2 & N_2O_4 vermenigvuldig met $0,08 \text{ dm}^3$
- Change in $n(\text{N}_2\text{O}_4) = \text{equilibrium } n(\text{N}_2\text{O}_4) - \text{initial } n(\text{N}_2\text{O}_4)$ ✓
Verandering in $n(\text{N}_2\text{O}_4) = \text{ewewig } n(\text{N}_2\text{O}_4) - \text{aanvanklike } n(\text{N}_2\text{O}_4)$
- USING ratio / GEBRUIK verhouding: $\text{NO}_2 : \text{N}_2\text{O}_4 = 2 : 1$ ✓
- Initial $n(\text{NO}_2) = \text{equilibrium } n(\text{NO}_2) + \text{change } n(\text{NO}_2)$. ✓
Aanvanklike $n(\text{NO}_2) = \text{ewewig } n(\text{NO}_2) + \text{verandering } n(\text{NO}_2)$.
- Final answer / Finale antwoord: 1,11 (mol) ✓
Accept range/Aanvaar gebied: 1,11 – 1,12 (mol)



OPTION 1 / OPSIE 1

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} \checkmark$$

$$171 \checkmark = \frac{[N_2O_4]}{(0,2)^2} \checkmark$$

$$\therefore [N_2O_4] = 171 \times (0,2)^2 \\ = 6,84 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

No K_c expression, correct substitution / Geen K_c -uitdrukking, korrekte substitusie: Max./Maks. $\frac{7}{8}$

Wrong K_c expression / Verkeerde K_c -uitdrukking:
Max./Maks. $\frac{5}{8}$

(8)

	NO ₂	N ₂ O ₄
Initial quantity (mol) Aanvangshoeveelheid (mol)	1,11 \checkmark	0
Change (mol) Verandering (mol)	1,094	0,55 \checkmark
Quantity at equilibrium (mol)/ Hoeveelheid by ewewig (mol)	0,016	0,55
Equilibrium concentration (mol·dm ⁻³) Ewewigskonsentrasie (mol·dm ⁻³)	0,2	6,84

ratio \checkmark
verhouding

$\times 0,08 \checkmark$

OPTION 2 / OPSIE 2

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} \checkmark$$

$$171 \checkmark = \frac{[N_2O_4]}{(0,2)^2} \checkmark$$

$$\therefore [N_2O_4] = 171 \times (0,2)^2 \\ = 6,84 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

No K_c expression, correct substitution / Geen K_c -uitdrukking, korrekte substitusie: Max./Maks. $\frac{7}{8}$

Wrong K_c expression / Verkeerde K_c -uitdrukking:
Max./Maks. $\frac{5}{8}$

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

2014 -11- 18

PRIVATE BAG X 110
PRETORIA 0001

PUBLIC EXAMINATIONS

Equilibrium moles / Ewewigsmol:

$$\begin{aligned} n(N_2O_4) &= (6,84)(0,080) \\ &= 0,55 \text{ mol} \\ n(NO_2) &= (0,2)(0,080) \\ &= 0,016 \text{ mol} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \checkmark \\ \times 0,08 \text{ dm}^3 \end{array} \right.$$

$$n(N_2O_4 \text{ formed/gevorm}) = 0,55 - 0 = 0,55 \text{ mol} \checkmark$$

Ratio / Verhouding:

$$n(NO_2 \text{ reacted / gereageer}) = 2n(N_2O_4 \text{ formed/gevorm}) = 2(0,55) = 1,094 \text{ mol} \checkmark$$

(8)

OPTION 3 / OPSIE 3

	NO ₂	N ₂ O ₄
Initial quantity (mol) Aanvangshoeveelheid (mol)	2x + 0,016	0
Change (mol) Verandering (mol)	✓ 2x	x ✓
Quantity at equilibrium (mol)/ Hoeveelheid by ewewig (mol)	0,016	x
Equilibrium concentration (mol·dm ⁻³) Ewewigskonsentrasie (mol·dm ⁻³)	0,2	$\frac{x}{0,08}$

ratio ✓
verhouding

x 0,08 &
÷ 0,08 ✓

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} \checkmark$$

$$171 \checkmark = \frac{0,08}{(0,2)^2} \checkmark$$

$$\therefore x = 0,05472$$

$$\therefore n(\text{initial/aanvanklik}) = 2(0,05472) + 0,16 \\ = 1,11 \text{ mol} \checkmark$$

No K_c expression, correct substitution/Geen K_c-uitdrukking, korrekte substitusie: Max./Maks. 7/8

Wrong K_c expression/Verkeerde K_c-uitdrukking:
Max./Maks. 5/8

(8)

OPTION 4 / OPSIE 4

	NO ₂	N ₂ O ₄
Initial quantity (mol) Aanvangshoeveelheid (mol)	x	0
Change (mol) Verandering (mol)	x - 0,16	$\frac{x - 0,16}{2}$ ✓
Quantity at equilibrium (mol)/ Hoeveelheid by ewewig (mol)	0,016	$\frac{x - 0,16}{2}$
Equilibrium concentration (mol·dm ⁻³) Ewewigskonsentrasie (mol·dm ⁻³)	0,2	$\frac{x - 0,16}{0,16}$

ratio ✓
verhouding

x 0,08 &
÷ 0,08 ✓

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} \checkmark$$


$$171 \checkmark = \frac{0,16}{(0,2)^2} \checkmark$$

$$\therefore x = 1,11 \text{ mol} \checkmark$$

No K_c expression, correct substitution/Geen K_c-uitdrukking, korrekte substitusie: Max./Maks. 7/8

Wrong K_c expression/Verkeerde K_c-uitdrukking:

Max./Maks. 5/8



(8)

CALCULATIONS USING CONCENTRATION
BEREKENINGE WAT KONSENTRASIE GEBRUIK

Mark allocation / Puntetoekenning:

- Correct K_c expression (formulae in square brackets). ✓
Korrekte K_c uitdrukking (formules in vierkantbakies).
- Substitution of concentrations into K_C expression. ✓
Vervanging van konsentrasies in K_C -uitdrukking.
- Substitution of K_C value. / Vervanging van K_C -waarde. ✓
- Change in $[N_2O_4]$ = initial $[N_2O_4]$ – equilibrium $[N_2O_4]$. ✓
Verandering in $[N_2O_4]$ = aanvanklike $[N_2O_4]$ – ewig $[N_2O_4]$.
- **USING ratio/GEBRUIK verhouding:** $NO_2 : N_2O_4 = 2 : 1$ ✓
- Initial $[NO_2]$ = equilibrium $[NO_2]$ + change in $[NO_2]$. ✓
Aanvanklike $[NO_2]$ = ewewigs $[NO_2]$ + verandering in $[NO_2]$.
- Equilibrium concentration of $[NO_2]$ multiplied by 0,08 dm³. ✓
Ewewigkonsentrasie van $[NO_2]$ vermenigvuldig met 0,08 dm³.
- Final answer/Finale antwoord: 1,11 (mol) ✓
Accept range/Aanvaar gebied: 1,11 – 1,12 (mol)

OPTION 5 / OPSIE 5

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} \quad \checkmark$$

$$171 \quad \checkmark = \frac{[N_2O_4]}{(0,2)^2} \quad \checkmark$$

$$\therefore [N_2O_4] = 171 \times (0,2)^2 \\ = 6,84 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

No K_c expression, correct substitution/Geen K_c -uitdrukking, korrekte substitusie: Max./Maks. $\frac{7}{8}$


Wrong K_c expression/Verkeerde K_c -uitdrukking:
Max./Maks. $\frac{5}{8}$

	NO ₂	N ₂ O ₄
Initial concentration (mol · dm ⁻³) Aanvangskonsentrasie (mol · dm ⁻³)	13,88	0
Change (mol · dm ⁻³) Verandering (mol · dm ⁻³)	13,68	6,84 ✓
Equilibrium concentration (mol · dm ⁻³) Ewewigkonsentrasie (mol · dm ⁻³)	0,2	6,84

ratio ✓
verhouding

$$n(NO_2) = cV = (13,88)(0,08) \quad \checkmark = 1,11 \text{ mol} \quad \checkmark$$

(8)



OPTION 6 / OPSIE 6

	NO ₂	N ₂ O ₄
Initial concentration (mol·dm ⁻³) Aanvangskonsentrasie (mol·dm ⁻³)	x	0
Change (mol·dm ⁻³) Verandering (mol·dm ⁻³)	x - 0,2	$\frac{x - 0,2}{2}$ ✓
Equilibrium concentration (mol·dm ⁻³) Ewewigskonsentrasie (mol·dm ⁻³)	0,2	$\frac{x - 0,2}{2}$

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} \checkmark$$

$$171 \checkmark = \frac{2}{(0,2)^2} \checkmark$$

$$\therefore x = 13,88 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

No K_c expression, correct substitution/Geen K_c-uitdrukking, korrekte substitusie: Max./Maks. 7/8

Wrong K_c expression/Verkeerde K_c-uitdrukking:
Max./Maks. 5/8

$$n(NO_2) = cV = (13,88)(0,08) \checkmark = 1,11 \text{ mol} \checkmark$$

(8)

6.3

- 6.3.1 Concentration (of the gases) increases. / Molecules become more condensed or move closer to each other. ✓
Konsentrasie (van die gasse) verhoog. / Molekule word meer saamgepers of beweeg nader aan mekaar.

(1)

6.3.2

- Increase in pressure favours the reaction that leads to smaller number of moles / volume of gas. ✓
Toename in druk bevoordeel die reaksie wat tot die kleiner getal mol / volume gas lei.
- Forward reaction is favoured. / Voorwaartse reaksie word bevoordeel. ✓
- Number of moles/amount of N₂O₄ / colourless gas increases.✓
Aantal mol/hoeveelheid N₂O₄ / kleurlose gas neem toe.

OR / OF


Number of moles/amount of NO₂ / brown gas decreases. ✓

Aantal mol/hoeveelheid NO₂ / bruin gas neem af.

(3)

6.4

- 6.4.1 Darker / Donkerder ✓
6.4.2 Decreases / Verlaag ✓



QUESTION 7/ VRAAG 7

PENALISE ONCE FOR THE INCORRECT CONVERSION OF UNITS.

PENALISEER EENMALIG VIR VERKEERDE OMSKAKELING VAN EENHEDE.

7.1

- 7.1.1 Ionises / dissociates completely (in water) ✓
Ioniseer / dissosieer volledig (in water)

(1)

- 7.1.2 NO_3^- / Nitrate ion / Nitraatioon ✓

(1)

- 7.1.3 $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] / -\log[\text{H}^+] \checkmark$
 $= -\log(0,3) \checkmark$
 $= 0,52 \checkmark$

Notes/Aantekeninge:

- If no/incorrect formula//Indien geen/foutiewe formule: Max./Maks: $\frac{2}{3}$
- If no substitution step: 2 marks for correct answer//Indien geen substitusie stap: 2 punte vir korrekte antwoord.

(3)

7.2

- 7.2.1 $c = \frac{n}{V} \checkmark$
 $2 = \frac{n}{0,1} \checkmark$
 $\therefore n(\text{HCl}) = 0,2 \text{ mol} \checkmark$

Notes/Aantekeninge

If incorrect conversion of cm^3 to dm^3 / Indien verkeerde omskakeling van cm^3 to dm^3 :

Max./Maks: $\frac{1}{3}$

(3)

- 7.2.2 Burette / Buret ✓

(1)

7.2.3 B ✓

~~-~~ Titration of strong acid and strong base. ✓✓

Titrasie van sterk suur en sterk basis.

OR/OF


The endpoint will be approximately at pH = 7 which is in the range of the indicator.

Die eindpunt sal ongeveer by pH = 7 wees wat in die gebied van die indikator is.

(3)

- 7.2.4 The number of moles of acid in the flask remains constant. ✓
Die getal mol van die suur in die fles bly konstant.

(1)



D *B*
L *M*

7.2.5

$$c = \frac{n}{V} \checkmark$$

$$0,2 = \frac{n}{0,021} \checkmark$$

$$n = 4,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \checkmark$$

$n(\text{HCl in excess/in oormaat})$:

$$= n(\text{NaOH})$$

$$= 4,2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Notes/Aantekeninge

- If incorrect conversion of cm^3 to dm^3
Indien verkeerde omskakeling van cm^3 to dm^3 : Max./Maks: $\frac{1}{3}$
- If already penalised for conversion of units in Q7.2.1, do not penalise again for substitution of incorrect unit.
Indien reeds gepenaliseer vir omskakeling van eenhede in Q7.2.1, moenie weer penaliseer vir substitusie van verkeerde eenheid nie. Max./Maks: $\frac{2}{3}$

(3)

7.2.6

POSITIVE MARKING FROM QUESTION 7.2.1 AND 7.2.5.
POSITIEWE NASIEN VAN VRAAG 7.2.1 EN 7.2.5.

Marking criteria / Nasienriglyne:

- $n(\text{HCl reacted})$ = Initial (from Q7.2.1) – excess (from Q7.2.5). \checkmark
 $n(\text{HCl reageer})$ = begin (van Q7.2.1) – oormaat (van Q7.2.5).
- Use mol ratio of acid : base = 1:2. \checkmark
Gebruik molverhouding suur : basis = 1:2
- Substitute / Vervang 40 into / in: $n = \frac{m}{M} \checkmark$
- $\frac{m(\text{MgO reacted/reageer})}{4,5} \times 100 \checkmark$
- Final answer / Finale antwoord: 87,11% \checkmark

PUBLIC EXAMINATIONS	2014 -11- 18	DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
		PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001

OPTION 1 / OPSIE 1

$$n(\text{HCl reacted/gereageer}): \\ 0,2 - 4,2 \times 10^{-3} \checkmark = 0,196 \text{ mol}$$

$$n(\text{MgO reacted/gereageer}): \\ \frac{1}{2}n(\text{HCl}) = \frac{1}{2}(0,196) \\ = 9,8 \times 10^{-2} \text{ mol} \checkmark$$

$$n(\text{MgO reacted/gereageer}) = \frac{m}{M}$$

$$\therefore 0,098 = \frac{m}{40} \checkmark$$

$$\therefore m = 3,92 \text{ g}$$

$$\% \text{ purity/suiwerheid} = \frac{3,92}{4,5} \times 100 \checkmark \\ = 87,11\% \checkmark$$

(Accept range: 87 – 87,11 %.)
(Aanvaar gebied: 87 – 87,11 %)

OPTION 2 / OPSIE 2

$$n(\text{HCl reacted/gereageer}): \\ 0,2 - 4,2 \times 10^{-3} \checkmark = 0,196 \text{ mol}$$

$$n(\text{HCl reacted/gereageer}) = \frac{m}{M} \\ 0,196 = \frac{m}{36,5} \\ \therefore m(\text{HCl reacted/gereageer}) = 7,154 \text{ g}$$

$$40 \text{ g MgO} \checkmark \dots \dots \dots 73 \text{ g HCl} \checkmark \\ x \text{ g MgO} \dots \dots \dots 7,154 \text{ g} \\ \therefore x = 3,92 \text{ g}$$

$$\% \text{ purity/suiwerheid} = \frac{3,92}{4,5} \times 100 \checkmark \\ = 87,11\% \checkmark$$

(Accept range: 87 – 87,11 %.)
(Aanvaar gebied: 87 – 87,11 %)

(5)

7.2.6

OPTION 3 / OPSIE 3

$$\frac{c_A V_A}{c_b V_b} = \frac{n_a}{n_b}$$

$$\frac{2 \times V_a}{0,2 \times 21} = \frac{1}{1}$$

$$V_a = 2,1 \text{ cm}^3$$

V(HCl reacted/gereageer):

$$\underline{100 - 2,1} \checkmark = 97,9 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned} n(\text{HCl}) &= cV \\ &= 2 \times 0,0979 \\ &= 0,196 \text{ mol} \end{aligned}$$

n(MgO reacted/gereageer):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}n(\text{HCl}) &= \frac{1}{2}(0,196) \\ &= 9,8 \times 10^{-2} \text{ mol} \checkmark \end{aligned}$$

$$n(\text{MgO reacted/gereageer}) = \frac{m}{M}$$

$$\therefore 0,098 = \frac{m}{40} \checkmark$$


$$\therefore m = 3,92 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ purity/suiwerheid} &= \frac{3,92}{4,5} \times 100 \checkmark \\ &= 87,11\% \checkmark \end{aligned}$$

(Accept range: 87 - 87,11 %)


(Aanvaar gebied: 87 – 87,11 %)

(5)
[21]



QUESTION 8 / VRAAG 8

- 8.1 • Pressure: 1 atmosphere (atm) / $101,3 \text{ kPa}$ / $1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ✓
Druk: 1 atmosfeer (atm) / $101,3 \text{ kPa}$ / $1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$
• Temperature/Temperatuur: 25°C / 298 K ✓
- 8.2 • Platinum is inert / does not react with the H^+ ions OR acid. ✓
Platinum is onaktief / reageer nie met die H^+ -ione OF suur nie.
• Platinum is a conductor (of electricity). ✓
Platinum is 'n geleier (van elektrisiteit).
- 8.3
8.3.1 Salt bridge / Soutbrug ✓
8.3.2 $-0,31 \text{ V}$ ✓
8.3.3 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ ✓✓



(2)

(2)

(1)

(1)

Marking guidelines / Nasienriglyne:

- $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ $\frac{1}{2}$ $\text{H}_2 = 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ $\frac{0}{2}$
- $\text{H}_2 \leftarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ $\frac{2}{2}$ $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ $\frac{0}{2}$
- Ignore if charge omitted on electron. / Ignoreer indien lading weggelaat op electron.
- If charge omitted on H^+ / Indien lading weggelaat op H^+ : Max./Maks: $\frac{1}{2}$

(2)

8.4

8.4.1 **POSITIVE MARKING FROM QUESTION 8.3.2.**

POSITIEWE NASIEN VAN VRAAG 8.3.2.

$$E_{\text{cell}}^{\theta} = E_{\text{reduction}}^{\theta} - E_{\text{oxidation}}^{\theta} \quad \checkmark$$

$$2,05 \checkmark = -0,31 \checkmark - E_{\text{M}/\text{M}^{2+}}^{\theta}$$

$$E_{\text{M}/\text{M}^{2+}}^{\theta} = -2,36 \text{ (V)} \checkmark$$

M is magnesium/ Mg. ✓

Option 2/ Opsie 2

$$\checkmark \left\{ \begin{array}{l} \text{M} \rightarrow \text{M}^{2+} + 2\text{e}^- \quad E^{\theta} = 2,36 \text{ (V)} \\ \text{X}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{X} \quad E^{\theta} = -0,31 \text{ (V)} \checkmark \\ E^{\theta} = 2,05 \text{ V} \checkmark \end{array} \right.$$

$$\text{Thus/Dus: } E_{\text{reduction}}^{\theta} = -2,36 \text{ (V)} \checkmark$$

M is magnesium/ Mg. ✓

Notes / Aantekeninge:

Accept any other correct formula from the data sheet.

Aanvaar enige ander korrekte formule vanaf gegewensblad.

Any other formula using unconventional abbreviations, e.g. $E_{\text{cell}}^{\theta} = E_{\text{OA}}^{\theta} - E_{\text{RA}}^{\theta}$ followed by correct substitutions: $\frac{4}{5}$

Enige ander formule wat onkonvensionele afkortings gebruik bv. $E_{\text{sel}}^{\theta} = E_{\text{OM}}^{\theta} - E_{\text{RM}}^{\theta}$ gevvolg deur korrekte vervangings: $\frac{4}{5}$

Notes / Aantekeninge


Give mark for Mg / magnesium ONLY if concluded from $-2,36 \text{ V}$.

Ken punt vir Mg / magnesium slegs toe indien afgelui uit $-2,36 \text{ V}$

(5)

8.4.2 Exothermic / Eksotermies ✓

(1)



- 8.5 The cell reaction reaches equilibrium. ✓
Die selreaksie bereik ewewig.

Notes / Aantekeninge:

Accept: One or more of reactants are used up. / The cell reaction has run to completion.

Aanvaar: Een of meer van reaktanse word opgebruik. / Die selreaksie het volledig verloop.


(1)
[15]

QUESTION 9 / VRAAG 9

- 9.1 Electrolytic / Elektrolities ✓

(1)





- 9.2 Q ✓ AND T ✓



Notes / Aantekeninge:

IF more than TWO electrodes, mark first two
Indien meer as TWEE elektrodes, sien eerste twee na.

Marking guidelines / Nasienriglyne



(4)

- 9.3

- 9.3.1 Cl_2 / chlorine (gas) / chloor(gas) ✓

(1)

- 9.3.2 Cu^{2+} (ions) / copper(II) ions / CuCl_2 / copper(II) chloride ✓

Cu^{2+} (ione) / koper(II)-ione / CuCl_2 / koper(II)chloried

(1)

- 9.4 Cu is a stronger reducing agent ✓ than Cl^- (ions) ✓ and Cu will be oxidised ✓ (to Cu^{2+}).


Cl^- (-ione) is 'n swakker reduseermiddel as Cu en Cu sal geoksideer word (na Cu^{2+}).

OR/OF

Cl^- (ions) is a weaker reducing agent ✓ than Cu ✓ and Cu will be oxidised ✓ (to Cu^{2+}).

Cl^- (-ione) is 'n swakker reduseermiddel as Cu en Cu sal geoksideer word (na Cu^{2+}).

(3)
[10]



QUESTION 10 / VRAAG 10

10.1

- 10.1.1 Nitrogen / N₂ / Stikstof ✓
Hydrogen / H₂ / Waterstof ✓

(2)

- 10.1.2 NH₃ + HNO₃ ✓ → NH₄NO₃ ✓ Bal. ✓

Notes / Aantekeninge:

- Reactants ✓ Products ✓ Balancing: ✓
Reaktanse Produkte Balansering
- Ignore double arrows. / Ignoreer dubbelpyle.
- Marking rule 6.3.10. / Nasienreeël 6.3.10.

(3)

10.2

Marking criteria / Nasienriglyne:

- Use ratio / gebruik verhouding: $\frac{3}{9}$ ✓
- x 20 kg ✓
- x 36 / 36 % ✓
- Final answer / Finale antwoord: 2,4 kg. ✓

OPTION 1 / OPSIE 1:

$$\begin{aligned}\% \text{ N} &= \frac{3}{9} \checkmark (\times 36) \checkmark \\ &= 12 \% \\ \therefore m(\text{N}) &: \frac{12}{100} (\times 20 \text{ kg}) \\ &= 2,4 \text{ kg} \checkmark\end{aligned}$$

OPTION 2 / OPSIE 2:


$$\begin{aligned}m(\text{nutrients/voedingstowwe}) &: \frac{36}{100} \checkmark (\times 20) = 7,2 \text{ kg} \\ \therefore m(\text{N}) &= \frac{3}{9} \checkmark \times 7,2 \\ &= 2,4 \text{ kg} \checkmark\end{aligned}$$

OPTION 3 / OPSIE 3:

$$m(\text{N}): \frac{3}{9} \times (\times 20) (\times \frac{36}{100}) = 2,4 \text{ kg} \checkmark$$

(4)
[9]

TOTAL/TOTAAL: 150



[Handwritten signatures and initials are present here]

**ANNEXURE TO THE MEMORANDUM OF PHYSICAL SCIENCES PAPER 2
NOVEMBER 2014**

Answers in this annexure are accepted for the purpose of marking only.
Antwoorde in hierdie aanhangsel word slegs vir nasiendoeleindes aanvaar.

QUESTION 2 / VRAAG 2

- 2.1
2.1.1 B / $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ / pentanal / pentanaal ✓ (1)
2.1.2 E / Correct structure drawn. / Korrekte struktuur geteken. ✓ (1)
2.1.3 F / pentan-2-one / pentan-2-oon ✓ (1)


QUESTION 3 / VRAAG 3

- 3.3
3.3.1

Criteria for investigative question/Riglyne vir ondersoekende vraag:	
The <u>dependent</u> and <u>independent</u> variables are stated. <i>Die afhanklike en onafhanklike veranderlikes is genoem.</i>	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Ask a question about the relationship between the <u>independent</u> and <u>dependent</u> variables. <i>Vra 'n vraag oor die verwantskap tussen die onafhanklike en afhanklike veranderlikes.</i>	✓

Examples/Voorbeelde:

- How does the functional group influence boiling point?
Hoe beïnvloed die funksionele groep die kookpunt?
- What is the relationship between the functional group and boiling point?
Wat is die verwantskap tussen die funksionele groep en kookpunt? (2)



Approved
Den Frans, M
Creswell
2014/11/17

QUESTION 5 / VRAAG 5

5.5

OPTION 5/OPSIE 5

$$n(\text{CaCO}_3 \text{ initially / aanvanklik}) = \frac{m}{M}$$

$$= \frac{25}{100}$$

$$= 0,25 \text{ mol}$$

$$n(\text{CaCO}_3) = n(\text{CO}_2 \text{ maximum})$$

$$= 0,25 \text{ mol}$$

$$n(\text{CO}_2 \text{ formed / gevorm}) = \frac{V}{V_m}$$

$$= \frac{4,5}{25,7} \checkmark$$

$$= 0,18 \text{ mol}$$

$$n(\text{CO}_2 \text{ not formed}) = 0,25 - 0,18$$

$$= 0,07 \text{ mol}$$

$$n(\text{CO}_2) = n(\text{CaCO}_3 \text{ impure}) = 0,07 \text{ mol} \checkmark$$

$$m = nM$$

$$= 0,07 \times 100 \checkmark$$

$$= 7 \text{ g} \checkmark$$

(Accept range: 7,00 g – 7,5 g)

(Aanvaar gebied: 7,00 g – 7,5 g) Max./Maks. $\frac{4}{5}$

(5)

QUESTION 7/ VRAAG 7

7.1

7.1.1 Ionises to a large extent. \checkmark

Ioniseer tot 'n groot mate.


(1)

7.2.3

B \checkmark

The endpoint will be neutral. $\checkmark \checkmark$
Die eindpunt sal neutraal wees.

(3)



7.2.6 **OPTION 4 / OPSIE 4**

$$n(\text{MgO assumed/aanvaar}) = \frac{m}{M}$$

$$= \frac{4,5}{40}$$

$$= 0,1125 \text{ mol}$$

$n(\text{HCl reacted/gereageer}):$
 $\underline{0,2} - 4,2 \times 10^{-3} \checkmark = 0,196 \text{ mol}$

$n(\text{MgO reacted/gereageer}):$
 $\frac{1}{2}n(\text{HCl}) = \frac{1}{2}(0,196)$
 $= 9,8 \times 10^{-2} \text{ mol} \checkmark$

$$\% \text{ purity/ suiwerheid} = \frac{0,098}{0,1125} \times 100 \checkmark$$

$$= 87,11\% \checkmark$$

(Accept range: 87 - 87,11 %.)

(Aanvaar gebied: 87 – 87,11 %)

Max./Maks. $\frac{4}{5}$ (5)

